



Bris uretre parazitološki na *Trichomonas vaginalis*

Bris uretre parazitološki na *Trichomonas vaginalis* se uzima u ambulanti Mikrobiološkog laboratorija od 7:05 do 14:30 sati. Nije poželjno uzimati uzorak u specijalističkim ambulantomama ili ordinaciji obiteljske medicine zbog osjetljivosti uzročnika (vegetativni oblici su osjetljivi na sušenje).

Uzorak se uzima sterilnim, tankim vatenim brisom.

Kod muškaraca se uzorak uzima na sljedeći način: Pacijenta se zamoli da skine hlače i donji veš. Pacijent legne na krevet za uzimanje uzoraka leđima prema dolje, ruke stavi uz tijelo i upozori ga se da se ne smije micati. Liječnik povuče prepucij (kožicu) prema dolje i sterilnom staničevinom navlaženom sterilnom fiziološkom prebriše glavić. Laboratorijski tehničar liječniku u ruke dodaje sterilni, tanki, Dacron bris kojeg liječnik lagano uvodi u mokraćnu cijev na dubinu od oko 2 cm i lagano ga zarotira u trajanju od nekoliko sekundi.

Pacijent se može tada obući. Prilikom prvog mokrenja, moguće da osjeti lagano peckanje radi iritacije sluznice brisom.

Nalaz je završen u vremenu od 4 radna dana. Liječnik koji je uputio pacijenta na pretragu može telefonski dobiti informaciju o porastu nakon 24 sata na telefon 653-167 od 7:00 - 15:00 h.

U nalazu je podatak da li je uzorak pozitivan ili negativan na *Trichomonas vaginalis*.